

Planternes navne artsepitetet.

| | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>aschersonianus</i> | efter den tyske botaniker Ascherson |
| <i>auriculata</i> | med ører |
| <i>australis</i> | sydlig |
| <i>austroamericanus</i> | sydamerikansk, voksende i Sydamerika |
| <i>azurea</i> | azurblå |
| <i>B</i> | |
| <i>balansae</i> | efter den franske botaniker Balansa |
| <i>beckettii</i> | efter finderen af planten Beckett |
| <i>berteroii</i> | efter den italienske læge og botaniker Bertero |
| <i>blassii</i> | efter den tyske vandplante-importør og -gartner Blass |
| <i>bleheri</i> | efter den kvindelige grundlægger af vandplante-gartneriet "Lotus Osiris" i Brasilien, Fru Bleher |
| <i>boivinianus</i> | efter den canadiske botaniker Boivin |
| <i>brasiliensis</i> | brasiliansk, voksende i Brasilien |
| <i>brevipes</i> | kort stængel |
| <i>bullosa</i> | dyrket med små udvækster (fremspring) |
| <i>C</i> | |
| <i>calamus</i> | rør-agtig |
| <i>cardinalis</i> | skarlagen- karmin-rød |
| <i>caroliniana</i> | Carolinsk, voksende i Carolina Nordamerika |
| <i>ciliata</i> | behåret, beskriver meget tætte hår på bladkanterne |
| <i>circinatus</i> | cirkelformet indrullet |
| <i>coloratus</i> | farvet |
| <i>cordata</i> | hjerteformig |
| <i>cordifolius</i> | hjertebladet |
| <i>cornuta</i> | hornede |



| | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| <i>corymbosa</i> | blomsterskærm-lignende |
| <i>costata</i> | ribbede |
| <i>crassipes</i> | tyk stængel |
| <i>crenata</i> | takkede |
| <i>crispus</i> | kruset |
| <i>D</i> | |
| <i>demersum</i> | nedlykket |
| <i>densus</i> | tæt |
| <i>diandra</i> | tvekønnet, med to støvblade |
| <i>diformis</i> | forskellig polymorf |
| <i>distachyos</i> | to-årig |
| <i>diversifolia</i> | forskelligt bladet |
| <i>dubia</i> | tvivlsom |
| <i>dubyana</i> | efter den gejstlige schweizer og botaniker Duby |
| <i>E</i> | |
| <i>echinatus</i> | stikkende som pindsvin |
| <i>elongatus</i> | forlænget |
| <i>erectum</i> | opret |
| <i>F</i> | |
| <i>filiformis</i> | trådformet |
| <i>fluitans</i> | flydende |
| <i>fluviatilis</i> | Flod, lever i floden |
| <i>G</i> | |
| <i>gayi</i> | efter den franske botaniker Gay |
| <i>gibba</i> | ujævn |
| <i>gigantea</i> | kæmpe |
| <i>globulifera</i> | pilledrager |



| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>graminea</i> | græsagtig |
| <i>gramineus</i> | græsagtig |
| <i>grisebachii</i> | efter den tyske botaniker Grisebach |
| <i>guadalupensis</i> | efter det mexikanske område Guadalupe |
| <i>guillottii</i> | efter den franske botaniker Guillott |
| <i>H</i> | |
| <i>hederaceus</i> | efeu-agtig |
| <i>helmsii</i> | efter den australske botaniker Helms |
| <i>henkelianus</i> | efter det tyske vandplante-gartneri Henkel |
| <i>heterophylla</i> | forskelligt bladet |
| <i>heterophyllum</i> | forskelligt bladet |
| <i>heudelotii</i> | efter Heudelot, indsamler af planten |
| <i>hippuroides</i> | gran lignende |
| <i>horemanii</i> | efter den engelske akvarist Horemann, finder af planten |
| <i>horizontalis</i> | vandret |
| <i>hottoniiflora</i> | blomst Hottonia lignende |
| <i>humboldtiana</i> | efter den tyske naturforsker Humboldt |
| <i>I</i> | |
| <i>indica</i> | indisk, voksende i Indien |
| <i>inflata</i> | opblæst |
| <i>J</i> | |
| <i>japanica</i> | japansk, voksende i Japan |
| <i>L</i> | |
| <i>lacustris</i> | i damme eller sører voksende |
| <i>laevigatum</i> | glat |
| <i>lanceolata</i> | lancet-formet |
| <i>lanceolatum</i> | lancet-formet |



| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <i>latifolium</i> | bredbladet |
| <i>latifolius</i> | bredbladet |
| <i>legroi</i> | efter den hollandske botaniker Legro |
| <i>leucocephala</i> | hvid-hovedet |
| <i>longifolia</i> | langbladet |
| <i>longifolius</i> | langbladet |
| <i>longiplumulosus</i> | med lang Plumula(skud voksende punkt på embryo i frøet) |
| <i>lucens</i> | lysende, glinsende |
| <i>lutea</i> | gul |
| <i>lyrata</i> | lyre-formet |
| <i>M</i> | |
| <i>macrandra</i> | med store støvblade |
| <i>madagascariensis</i> | madagaskisk, voksende på Madagascar |
| <i>maior</i> | stor |
| <i>major</i> | stor |
| <i>malinverniana</i> | efter finderen af planten Malinvern |
| <i>micranthemooides</i> | Micranthemum lignende |
| <i>minima</i> | meget lille |
| <i>minor</i> | lille |
| <i>monniera</i> | efter den franske læge og botaniker Monnier |
| <i>monticola</i> | bjerg beboer |
| <i>morsus-ranae</i> | Frøbid (gammelt plantenavn) |
| <i>myriophylloides</i> | tusindblad lignende (<i>Myriophyllum</i>) |
| <i>N</i> | |
| <i>nana</i> | dværg |
| <i>natans</i> | flydende |
| <i>neotropicallis</i> | neo-tropisk, voksende i Sydamerika |




| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <i>nevillii</i> | efter finderen af planten Nevill |
| <i>nummilaria</i> | mønt-lignende |
| <i>nuttallii</i> | efter den engelske botaniker Nuttall |
| <i>O</i> | |
| <i>octandrus</i> | med otte støvdragere |
| <i>opacus</i> | dunkel, glansløs |
| <i>osiris</i> | efter gartneriet "Lotus Osiris" i Brasilien |
| <i>P</i> | |
| <i>palustris</i> | sump, lever i sumpen |
| <i>parva</i> | lille |
| <i>parviflorus</i> | småblomstrende |
| <i>parvula</i> | meget lille |
| <i>peltata</i> | skilteformet, rundet blad, stængel underneden |
| <i>perfoliatus</i> | blade gennemvokset |
| <i>petchii</i> | efter den engelske botaniker Petch |
| <i>piauhyensis</i> | piauhyensis, voksende i den brasilianske stat Piaul(tidligere Piauhy) |
| <i>plantago-aquatica</i> | vejbred i vand |
| <i>platyphylla</i> | bredbladet |
| <i>polyrrhiza</i> | mange rødder |
| <i>polysperma</i> | mange frøet |
| <i>pontederiifolia</i> | pontederiabladet, bladene minder om Pontederis-arter |
| <i>portoalegrensis</i> | portoalegrensk, voksende ved Porto Alegre(Sydamerika) |
| <i>pseudacorus</i> | falsk kalmus(Acorus) |
| <i>pteridioides</i> | bregne lignende |
| <i>pteropus</i> | vinget |
| <i>pulcherrima</i> | meget smuk |
| <i>pumila</i> | lav |



| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| <i>purpurascens</i> | bliver lilla(purpur) |
| <i>purpurea</i> | rent lilla |
| <i>Q</i> | |
| <i>quadricostatus</i> | fire ribbed |
| <i>quadrifolius</i> | firebladet |
| <i>R</i> | |
| <i>ranunculoides</i> | ranunkel lignende |
| <i>reineckii</i> | efter Reineck, plantens finder |
| <i>repens</i> | krybende |
| <i>retrospiralis</i> | omvendt skrueformet |
| <i>rigidifolius</i> | stivbladet |
| <i>rotundifolius</i> | rundbladet |
| <i>S</i> | |
| <i>sagittifolia</i> | pilbladet |
| <i>salicaria</i> | pil, minder om pil (Salix) |
| <i>scabratum</i> | ru, skarp |
| <i>schreberi</i> | efter den tyske botaniker Schreber |
| <i>senegalensis</i> | senegalensisk, voksende i Senegal |
| <i>sessiliflora</i> | med siddende blomster |
| <i>sessilis</i> | siddende stilkløst |
| <i>setacea</i> | børsteformet |
| <i>siamensis</i> | siamesisk, voksende i Thailand (tidligere Siam) |
| <i>spicatum</i> | aksbærrende |
| <i>spiralis</i> | skrueformet |
| <i>spongia</i> | svampet |
| <i>stratiotes</i> | sværdformet |
| <i>subalatus</i> | svagt bevinget |



| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>submersum</i> | neddykket |
| <i>subulata</i> | sylformet |
| <i>T</i> | |
| <i>tenellus</i> | meget sart |
| <i>teres</i> | trind |
| <i>terragona</i> | firkantet |
| <i>thaianum</i> | thaiisk, voksende i Thailand |
| <i>thalictroides</i> | spids diamant-lignende |
| <i>thwaitesii</i> | efter den engelske botaniker Thwaites |
| <i>trichophyllum</i> | hårbladet |
| <i>trifoliata</i> | trebladet |
| <i>trisulca</i> | trefuret |
| <i>U</i> | |
| <i>ulvaceus</i> | ulva-agtig, minder om havalgearten Ulva |
| <i>umbellatus</i> | doldig, beskriver blomsterstanden  |
| <i>umbrosum</i> | skygge-elskende |
| <i>undulatus</i> | bølget |
| <i>uruguayensis</i> | uruguayisk, voksende i Uruguay |
| <i>ussuriense</i> | ussuriensisk, voksende i området Ussuri(grænseflod mellem Kina og Rusland) |
| <i>V</i> | |
| <i>valerandi</i> | efter botanikeren Valerand |
| <i>verticillata</i> | hvirvel, krans |
| <i>verticillatum</i> | hvirvel, krans |
| <i>vesiculosa</i> | blæret |
| <i>virginica</i> | virginisk, voksende i den nordamerikanske stat Virginia |
| <i>vivipara</i> | levende-bærende |



| | |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| <i>vulgaris</i> | normal, sædvanlig |
| <i>W</i> | |
| <i>walkeri</i> | efter den nordamerikanske botaniker Walker |
| <i>wallichii</i> | efter den danske botaniker Wallich |
| <i>weatherbiana</i> | efter den nordamerikanske botaniker Weatherby |
| <i>wendtii</i> | efter den tyske akvarist og vandplantekender Wendt |
| <i>willisii</i> | efter den australske botaniker Willis |
| <i>Z</i> | |
| <i>zosterifolia</i> | søgræs bladet, bladene minder om Zostera arten |
| <i>zosteriformis</i> | søgræs agtig (Zostera) |

USB-Akvariegødning

